



## RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS

### Avant un maquillage permanent

Vous venez de prendre rendez-vous en vue d'effectuer une prestation de maquillage permanent avec **REGARD DE LOU**.

En tant que cliente privilégiée, vous bénéficierez d'une première retouche offerte, qui se tiendra **4 à 8 semaines** après votre intervention.

Par la suite et afin de maintenir une qualité irréprochable de votre maquillage permanent, il est préférable d'effectuer une retouche tous les **12 à 18 mois**. En effet, les couleurs s'atténuent au fil des mois.

Afin de garder des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante, la retouche est donc conseillée.

A l'inverse si aucun entretien n'est effectué, vous perdrez votre tracé au bout de 3 à 5 ans sans disparaître totalement pour autant.

#### PRECAUTIONS - RECOMMANDATIONS :

Préalablement à votre séance de maquillage permanent et afin d'en assurer la longévité, il convient de respecter quelques consignes simples, qui sont à effectuer peu importe la zone concernée, et durant **les 3 jours qui précèdent l'intervention**, (à faire confirmer par votre médecin traitant ou bien votre pharmacien)

- 1- Prendre de l'**Arnicha\* 9ch** (à raison de 3 doses par jour pendant 3 jours)
- 2- Prendre de l'**Extranase\*** (à raison de 3 comprimés par jour pendant 3 jours)
- 3- Ne surtout pas prendre d'aspirine durant les **5 jours** qui précèdent l'intervention

#### TRAITEMENTS PARTICULIERS EN FONCTION DE LA ZONE TATOUÉE :

**YEUX :** Prévoir de la crème **Vitamine A DULCIS\***, prévoir du **Vitabact\***

**SOURCILS :** Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire prescrire par votre médecin traitant de la crème anesthésiante **Emla\* 5%** (mettre la crème 2 heures avant notre rdv en couche épaisse et recouverte d'un film)  
Faire un gommage de la zone 3 jours avant la prestation puis bien l'hydrater jusqu'au jour de l'intervention

**BOUCHE :** Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire prescrire par votre médecin traitant de la crème anesthésiante **Emla\* 5** (mettre la crème 2 heures avant notre rdv en couche épaisse et recouverte d'un film)  
Prévoir pour votre retour à domicile, une poche de glace pour éviter l'œdème  
**Si vous êtes sujet aux boutons de fièvre :** Prendre un traitement tel que **Zovirax\***, prendre 3 comprimés 3 jours avant votre rendez-vous et poursuivre pendant 3 jours  
Faire un gommage de la zone 3 jours avant la prestation puis bien l'hydrater jusqu'au jour de l'intervention

Tous ces **produits\*** se trouvent en pharmacie ; vous devez toutefois vous faire confirmer par votre médecin traitant, qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que vous les utilisiez

*Dans tous les cas, la société REGARD DE LOU décline toute responsabilité si une réaction survenait à l'issue de l'un des traitements préconisés dans le présent feuillet*